

Лихорадка КУ (кокциеллез) вызвана заражением паразитарными микроорганизмами. Способ заражения может быть любым – укус клеща или от контакта с инфицированным клещом животного, через молоко, воздушно-капельным путем, зараженные продукты, через неповрежденные слизистые и через микротравмы кожных покровов, обычно при оказании акушерской и ветеринарной помощи, при убое и разделке туш животных.

В природе резервуаром кокциелл являются клещи, дикие мелкие млекопитающие. Среди сельскохозяйственных животных основными носителями является мелкий и крупный рогатый скот.

В ряде случаев источниками инфекции могут быть собаки, лошади, верблюды, яки, кошки, пушные животные, птицы, в том числе декоративные, и другие животные.

Инкубация при кокциеллезе – до 3-х недель.

Картина – по аналогии с гриппом:

- резкое повышение температуры, сопровождающееся головными, отраженными в глазницы, приступообразными болями;
- боль в мышцах, общее недомогание, выраженная клиника респираторных органов;
- температура (даже при своевременном лечении) может сохраняться на уровне 38,5-40 градусов до 3 недель.

Лихорадка при кокциеллезе наблюдается волнообразно с внезапными обострениями. Сопровождается ознобом, повышенным потоотделением. Заражение кокциеллезом опасно тем, что может воздействовать на основные органы. В зоне риска при кокциеллезе – печень, сердечно-сосудистая, центральная нервная системы.

Диагностируется кокциеллез сложно, при помощи ряда непростых лабораторных исследований.

Кокциеллез лечится антибиотиками на протяжении очень длительного времени (от 3 месяцев до 2 лет) в комбинации с прочими медицинскими препаратами и процедурами. Микроорганизмы, вызывающие кокциеллез, чувствительны далеко не к каждому антибиотику. Препарат должен подобрать лечащий врач. Медики отдают предпочтение антибиотикам тетрациклинового ряда, например, доксицилин.

Меры профилактики кокциеллеза:

- рекомендуется регулярно выкашивать траву и проводить противоклещевую обработку подворья;
 - остерегаться контакта с клещами (укус, раздавливание, аккуратно снимать с домашних животных, не допуская соприкосновения с ним и его раздавливание), использовать репеллентно-акарицидные средства;
 - ограничить контакты с животными;
 - не употреблять в пищу не обработанные термически молоко и мясо;
 - крайне осторожно производить забой животных и разделывание их туш;
 - соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки с мылом, не есть грязными руками, не трогать слизистые, не тереть глаза, нос, раны и ссадины грязными руками);
 - раны и ссадины незамедлительно обработать дез. средствами;
 - в случае возникновения симптомов необходимо своевременно обратиться к врачу.
- По информации Роспотребнадзора.